

## AGRAMECTIN DRENCH – Solution Orale

**Composition:**

Chaque ml de solution contient 0,8 mg d'ivermectine.

**Indications:**

Traitement et contrôle des infections mixtes de nématodes gastro-intestinaux, notamment des souches d'*Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta* et *Trichostrongylus colubriformis* résistant au benzimidazole, chez les veaux, les ovins et les caprins.

Agramectin Drench est également efficace contre les stades larvaires du bot nasal (*Oestrus ovis*) et des vers pulmonaires (*Dictyocaulus filaria*).

**Effets secondaires:** légère toux après le traitement qui ne doit être que temporaire, douleurs musculo-squelettiques, œdème du visage ou des extrémités, démangeaisons et éruption papuleus.

**Dosage and Administration:** Oralement, à l'aide de tout équipement de trempage standard. La dose générale est de 2,5 ml par 10 kg de poids corporel.

**Abstention:** Viande: 14 jours

Lait : Les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine ne doivent pas être traités pendant la lactation ni dans les 28 jours suivant le début de la lactation.

**Conservation:** Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière. Garder hors de la portée des enfants.

**Présentations:**

Bidon en plastique pour 500 ml, 1 litre.

**USAGE VETERINAIRE SEULEMENT**